Pla Vacunal del Gat

La vacunació és clau en la prevenció de greus malalties

Què és una vacuna?

- ✓ **Una vacuna** conté petites quantitats de virus o bacteris causants de malalties a les quals se'ls ha reduït el seu potencial infectant.
- ✓ Quan s'administra, **estimulen el sistema immunitari del gat** per produir cèl · lules de defensa i anticossos que **protegiran contra una possible infecció.**

Per què hem de vacunar?

- ✓ Els gats vacunats amb regularitat **són menys susceptibles a tenir malalties infeccioses**.
- ✓ La **vacunació i una pauta de revisions de salut periòdiques** en els gats **augmenten la seva esperança de vida.**

I els efectes secundaris?

- ✓ Excepcionalment poden donar **reaccions adverses lleus** que desapareixen en poques hores.
- ✓ Possibles símptomes són **decaïment i debilitat** momentanis, **pèrdua de gana, dolor lleu o inflor** al punt d'injecció.

Garantia d'éxit

- ✓ El gat ha de trobar-se en un **estat de salut òptim i ben desparasitat en el moment de la vacunació** i seguir la pauta vacunal recomanada per la clínica.
- ✓ **Hem de saber que cap vacuna protegeix al 100%.**

Per què vacunar al meu gat si mai surt al carrer?

Creure que si el teu gat no surt a l'exterior, està lliure de perill i no cal vacunar és un error.

Tingues en compte que:

- ✓ El teu gat **pot ser portador de bacteris** o virus que li infectarien si tingués una baixada de defenses.
- ✓ **Tot contacte puntual amb un altre animal** suposaria un risc elevat.
- ✓ Nosaltres podem transportar en la **roba o les sabates microorganismes** amb capacitat infectant.

De què vacuno al meu gat?

A Nouclinic establirem el **programa vacunal** més adequat per a cada gat segons l'edat, l'estil de vida o la zona on viu.

Les vacunes més recomanades

Panleucopènia Felina

Malaltia vírica molt contagiosa que **pot ser mortal**. Està provocada per un parvovirus summament resistent a l'entorn**. Els gats joves sense vacunar són els més propensos a patir-la.**

- ✓ **Símptomes**: decaïment, febre, vòmits i diarrees sanguinolentes, anèmia, leucopènia i deshidratació.
  La infecció apareix per la ingesta del virus a través del contacte amb objectes, persones o animals tacats amb les femtes infectades.
- ✓ **La seva vacunació és essencial en gatets de poques setmanes!!**

Altres vacunes:

- ✓ Rinotraqueitis felina
- ✓ Calicivirus felina
- ✓ Clamidiasis felina
- ✓ La Rabia

Peritonitis infecciosa felina (PIF)

Malaltia viral agressiva, difícil de **diagnosticar molt comú en la població felina** que s'encomana per secrecions corporals entre gats.
Mortal quan es desenvolupa i molt típica de llars o refugis amb molts gats. Apareix sobretot en animals immunodeprimits especialment en joves i gats grans.

- ✓ **Hi ha una vacuna específica.**

Leucèmia (FeLV)

El virus de la leucèmia felina està **àmpliament estès entre els gats de tot el món** i en els exemplars infectats persistentment per ell origina una **greu depressió del sistema immunitari**. El retard en el creixement i el càncer són dues de les moltes alteracions causades per aquest virus, que **és incurable i pot provocar la mort**.

- ✓ **Alguns Símptomes**: febre, apatia, falta de gana, aprimament, inflamació de ganglis, lenta curació de malalties comunes, possible càncer en cèl · lules sanguínies o òrgans interns, anèmia.
- ✓ **La vacunació prevé la infecció i la malaltia.**

Inmunodeficiència felina (FIV)

De la mateixa manera que el VIH (SIDA) en els humans, **el FIV ataca el sistema immunològic del gat** evitant que pugui batallar contra infeccions comunes.
El gat amb FIV no contagia els humans, encara que el virus ve de la mateixa família que el VIH, és específic per als felins.

- ✓ El virus **es transmet a través de la saliva, sobretot quan ve unida a mossegades amb sang.**
- ✓ **La vacunació prevé del contagi.**

Pauta vacunal a Nouclinic

- ✓ **1ª dosi de la Trivalent** als 2 mesos de vida (8 setmanes)
- ✓ **2ª dosi: de la Trivalent** als 2,5-3 mesos (10-12 setmanes)
- ✓ **Adults:** revacunació anual

Vacunar cada any és fonamental

per augmentar la seva esperança de vida